

1. São músculos da mastigação todos os abaixo, EXCETO:
  - a) pterigóide medial
  - b) temporal
  - c) prócero**
  - d) masseter
  
2. NÃO é, em geral ramo do tronco celíaco:
  - a) hepática comum
  - b) gástrica esquerda
  - c) mesentérica superior**
  - d) esplênica
  
3. O líquido deixa o terceiro ventrículo chegando ao quarto ventrículo através da:
  - a) abertura mediana (forame de Magendie)
  - b) aqueduto do mesencéfalo (de Sylvius)**
  - c) abertura lateral (forame de *Luschka*)
  - d) forame interventricular (forame de Monro)
  
4. Qual dos nervos abaixo inerva a língua:
  - a) trigêmeo**
  - b) vago
  - c) acessório
  - d) abducente
  
5. Qual das veias abaixo NÃO é tributária da veia porta:
  - a) mesentérica superior
  - b) esplênica
  - c) gástrica esquerda
  - d) hepáticas**
  
6. Assinale o item INCORRETO:
  - a) tecido fibroso é o tecido interposto nas suturas
  - b) o disco intervertebral é um exemplo de articulação do tipo sínfise
  - c) somente as articulações sinoviais têm ligamentos**
  - d) diartrose e articulação sinovial são termos equivalentes
  
7. Qual dos acidentes ósseos abaixo NÃO pertence ao osso temporal?
  - a) processo estilóide
  - b) processo mastóide
  - c) lâmina crivosa**
  - d) meato acústico interno
  
8. Ligamento conóide e ligamento trapezóide são partes formadoras do ligamento:
  - a) acrômioclavicular
  - b) glenoumaral
  - c) coracoclavicular**
  - d) coracoacromial

9. Qual dos órgão abaixo não possui hilo?

- a) testículo
- b) baço
- c) rim
- d) cerebello**

10. NÃO forma o círculo arterial do cérebro (polígono de Willis):

- a) art. cerebral anterior
- b) art comunicante posterior
- c) art. basilar**
- d) art. cerebral posterior

11. Durante a fase final da extensão da articulação do joelho, acontece tudo o que segue, EXCETO:

- a) o músculo articular do joelho está contraído puxando a cápsula sinovial superiormente
- b) o músculo sartório participa na extensão do joelho**
- c) estiramento do músculo poplíteo
- d) os ligamentos cruzados tornam-se esticados

12. O duto \_\_\_\_\_ une-se ao duto \_\_\_\_\_, formando o duto \_\_\_\_\_.

A opção que melhor preenche a afirmativa abaixo sobre as vias biliares é:

- a) cístico, hepático comum, colédoco**
- b) hepático direito, hepático esquerdo, colédoco
- c) colédoco, hepático comum, cístico
- d) cístico, colédoco, hepático esquerdo

13. São núcleos cerebelares todos os abaixo, exceto:

- a) emboliforme
- b) globoso
- c) rubro**
- d) denteado

14. A maior parte do volume seminal é secretado pelo (a):

- a) próstata
- b) testículo
- c) vesícula seminal**
- d) glândulas bulbo-uretrais

15. Durante a realização de punção lombar para a coleta de líquido para diagnóstico de meningite são perfurados, em sequência, os seguintes ligamentos espinhais:

- a) interespinhal, longitudinal anterior e longitudinal posterior
- b) supraespinhal, interespinhal, e amarelo**
- c) supraespinhal, interespinhal e longitudinal posterior
- d) longitudinal posterior, amarelo e longitudinal anterior

16. Das veias abaixo, aquela que se localiza no sulco deltopeitoral é a:

- a) basílica
- b) axilar
- c) braquial
- d) cefálica**

17. Qual das artérias abaixo é ramo intracavernoso da carótida interna:

- a) tronco meningo-hipofisário**
- b) art. recorrente (de Heubner)
- c) coróidea anterior
- d) art. hipofisária superior

18. Sobre a anatomia dos pulmões é CORRETO afirmar que:

- a) somente o pulmão esquerdo possui a impressão cardíaca
- b) a língula está presente no lobo médio do pulmão esquerdo
- c) a fissura horizontal é exclusiva do pulmão direito**
- d) o pulmão esquerdo apresenta o sulco da veia ázigos

19. Quantas cartilagens, contando as pares como duas, formam o arcabouço laríngeo? (RESPOSTA CORRIGIDA APÓS RECURSO)

- a) 6
- b) 7
- c) 9**
- d) 11

20. Uma diferença entre a dentição decídua e a dentição permanente é:

- a) presença de caninos apenas na dentição permanente
- b) presença de pré-molares apenas na dentição permanente**
- c) presença de segundos-molares apenas na dentição permanente
- d) presença de terceiros-molares na dentição decídua

21. Sobre o sistema linfático é INCORRETO afirmar que:

- a) Uma das funções do baço é filtrar a linfa**
- b) os linfonodos axilares drenam da região mamária
- c) os vasos linfáticos apresentam válvulas que mantêm o fluxo unidirecional
- d) o duto torácico conduz a linfa da maior parte do corpo para o sistema venoso

22. Entra na composição óssea do septo nasal

- a) cartilagem do septo nasal
- b) processo pterigóideo do osso esfenóide
- c) lâmina crivosa do osso etmóide
- d) vômer**

23. O plano anatômico que divide o corpo em parte anterior e parte posterior é chamado de:

- a) axial
- b) sagital
- c) mediano
- d) frontal**

24. Durante a diástole, as valvas atrioventriculares encontram-se

- a) abertas**
- b) fechadas
- c) aberta à direita e fechada à esquerda
- d) aberta à esquerda e fechada à direita

25. A opção que apresenta um par de glândulas, sendo a primeira endócrina e a segunda exócrina é:

- a) mamária e tireóide
- b) pâncreas e hipófise
- c) pâncreas e sudorípara**
- d) testículo e coração

26. O fundo de saco de Douglas localiza-se:

- a) entre a parede retal anterior e a parede uterina posterior**
- b) na goteira parieto-cólica direita
- c) entre útero e bexiga
- d) anexo à fáscia retal entre a próstata e o reto

27. Os músculos abaixo apresentam inserção proximal (ou superior) comum, EXCETO:

- a) peitoral menor
- b) córacio-braquial
- c) bíceps cabeça curta
- d) braquial anterior**

28. Dos músculos abaixo, aquele que NÃO se localiza na região ântero-lateral do abdome é o:

- a) piramidal
- b) oblíquo externo
- c) reto abdominal
- d) psoas maior**

29. São exemplos de articulações monoaxial e triaxial, respectivamente:

- a) ombro (gleno-umeral) e quadril (coxo-femoral)
- b) punho (intracárpicas) e atlanto-axial
- c) atlanto-axial e ombro (gleno-umeral)**
- d) tornozelo (talocrural) e cotovelo (úmero-ulnar)

30. O ponto craniométrico resultado da união entre as suturas lambdóide, occiptomastóide a parieto-mastóide chama-se:

- a) ptério
- b) astério**
- c) estefânio
- d) bregma

31. O \_\_\_\_\_ atravessa toda a porção petrosa do osso temporal, deixando-a pelo forâmen estilomastóideo.

- a) plexo cervical
- b) nervo facial**
- c) nervo glossofaríngeo
- d) ramo auricular do vago

32. Um choque direto na patela pode fraturá-la em dois ou mais fragmentos, podendo ser necessário remover a patela. Se a patela for removida:

- a) o músculo quadríceps da coxa não estenderá mais a perna
- b) a pessoa pressionará a extremidade distal da coxa durante a marcha, para evitar a flexão da articulação do joelho
- c) será necessário que o grupamento do “jarrete” estenda a perna
- d) será necessário mais força para que o músculo quadríceps da coxa estenda a perna completamente**

33. Os músculos abaixo são inervados pelo VII nervo craniano, EXCETO:

- a) pterigóide medial**
- b) platisma
- c) bucinador
- d) prócero

34. Compõe a orelha externa:

- a) membrana timpânica
- b) pirâmide petrosa
- c) escafa**
- d) processo estilóide

35. Compõe o epitálamo as seguintes estruturas, EXCETO:

- a) comissura posterior
- b) glândula pineal
- c) núcleo das habênulas
- d) núcleo basal de Meynert**

36. A opção que contém um osso curto e um osso pneumático, nessa ordem é:

- a) esfenóide e talus
- b) navicular e maxila**
- c) falange distal e frontal
- d) vértebra e occipital

37. Sobre a anatomia da traquéia e dos brônquios é INCORRETO afirmar que:

- a) os anéis traqueais são incompletos
- b) o brônquio principal direito, em geral é mais verticalizado que o esquerdo
- c) a traquéia relaciona-se posteriormente com o esôfago
- d) existe um total de 6 brônquios lobares**

38. As cartilagens alar, triangular e sesamóide encontram-se no:

- a) joelho
- b) orelha
- c) traquéia
- d) nariz**

39. Sobre o sistema articular é CORRETO afirmar que? **ANULADA**

- a) em geral, quanto maior a mobilidade, menor a estabilidade.**
- b) as anfiartroses são as articulações mais móveis
- c) gonfose é um tipo de articulação fibrosa**
- d) as articulações sinoviais são também chamadas de sinartroses

40. Dos músculos abaixo aquele que NÃO compõe o manguito rotador é:

- a) supraespinhal
- b) infraespinhal
- c) redondo maior**
- d) subescapular

41. São considerados núcleos da base todos os abaixo, EXCETO:

- a) caudado
- b) putame
- c) fastigial**
- d) globo pálido

42. O forame magno pertence ao osso:

- a) occipital**
- b) esfenóide
- c) parietal
- d) temporal

43. Putâme e globo pálido são conhecidos conjuntamente como:

- a) corpo lentiforme**
- b) cápsula interna
- c) claustrum
- d) pálido interno

44. Qual dos ligamentos abaixo NÃO pertence à articulação do joelho:

- a) cruzado anterior
- b) deltóide**
- c) cruzado posterior
- d) colateral lateral

45. NÃO se constitui num acidente (anatômico) de relevo mucoso laríngeo

- a) **ligamento vocal**
- b) prega vestibular
- c) ventrículo da laringe
- d) cavidade infraglótica

46. Na luxação da mandíbula, o deslocamento do disco articular além do tubérculo articular da articulação temporomandibular resulta de espasmo ou contração excessiva de qual dos seguintes músculos:

- a) bucinador
- b) **pterigóideo lateral**
- c) pterigóideo medial
- d) temporal

47. A lesão inadvertida dos nervos laríngeos recorrentes, durante uma tireoidectomia, pode apresentar:

- a) tensão nas cordas vocais
- b) paralisia dos músculos esternohióideos
- c) paralisia da musculatura da língua
- d) **paralisia bilateral das pregas vocais**

48. Seguindo a via de drenagem linfática normal dos pulmões, um câncer no pulmão direito pode dar metástase em tudo o que se segue, EXCETO:

- a) linfonodos broncopulmonares direitos
- b) linfonodos traqueobronquiais direitos
- c) linfonodos paratraqueais esquerdos
- d) **linfonodos axilares direitos**

49. Assinale o item INCORRETO:

- a) cada lóbulo da mama é drenada por um ducto lactífero que se abre na papila mamária
- b) a drenagem linfática do quadrante súpero-lateral da mama faz-se para os linfonodos axilares
- c) **a glândula mamária está firmemente fixada na derme da pele suprajacente por retináculos da pele que formam o processo axilar da mama**
- d) entre a mama e a fáscia peitoral existe um espaço potencial denominado de espaço retromamário

50. A necrose da mucosa do reto comumente não deve resultar de obstrução da artéria mesentérica inferior porque:

- a) a irrigação do reto procede de conexões anastomóticas da artéria mesentérica superior
- b) a irrigação do reto procede da artéria cólica esquerda que se anastomosa com ramos da artéria ílica interna
- c) um ramo da artéria ílica externa é a principal fonte de irrigação do reto
- d) **a artéria retal média, um ramo da artéria ílica interna, supre o reto**